

INCIDENCE RŮZNÝCH TYPŮ ALOPECIE U ŽEN

VYHODNOCENÍ SOUBORU PACIENTEK SLEDOVANÝCH A LÉČENÝCH NA KLINICE CHOROB KOŽNÍCH A POHLAVNÍCH LF UP V OLOMOUCI A FNOL V LETECH 2012-2022

Autor: Dočkalová C., Papajíková K.

Školitel: Bienová M., MUDr., Ph.D.

ÚVOD

Alopecie představují heterogenní skupinu onemocnění s různou etiologií a většinou nepředvídatelným a individuálním průběhem. Jsou charakterizované ztrátou vlasů a v některých případech i ostatního ochlupení. Dělíme je na nejzjevnatější a jizevnatější, přičemž klinicky převažují formy nejzjevnatější. Nejčastější ložiskovou alopecii je alopecia areata autoimunitní etiologie, mezi nejčastější difúzní alopecie patří telogenní efluvium a androgenetická alopecie. Telogenní efluvium vzniká často jako následek stresu, nemocí, malnutrice, hormonální dysbalance a léků.

CÍLE

Cílem této práce je vyhodnotit incidenci různých typů alopecie u pacientek sledovaných a léčených na Klinice chorob kožních a pohlavních LF UP v Olomouci a FNOL v letech 2012-2022.

METODIKA


Retrospektivní analýza souboru 1517 pacientek s diagnózou jednoho či více typů alopecie a zhodnocení incidence v daném časovém období.

VÝSLEDKY


V souboru 1517 pacientek byla u 433 z nich diagnostikována alopecie areátní, 502 alopecie androgenetická, 581 telogenní efluvium a 170 mělo jizvící formu alopecie (graf 1). V některých případech trpěly pacientky více druhy alopecie současně. U ložiskové alopecie byl pozorován významný nárůst incidence v letech 2012 a 2022 (graf 2). Podobný fenomén byl pak také u alopecie androgenetické (graf 4) a telogenního efluvia (graf 5). U jizevnaté alopecie byl rovněž registrován významný nárůst incidence zejména v roce 2022, kdy hodnoty dosahovaly více než trojnásobku průměru (graf 6).

ZÁVĚR


V roce 2022 byl zaznamenán masivní vzestup incidence všech typů alopecie, pravděpodobně související s pandemií COVID-19. Tento rok byl kritický z důvodu války na Ukrajině a zhoršující se ekonomické situace. Uvedené okolnosti působily jako významné stresory pro mnoho lidí a tedy byly i rizikovým faktorem pro vznik alopecie. U některých forem alopecie byl podobný nárůst pozorován také kolem roku 2012, tedy v období velké ekonomické recese.




graf 1




graf 4



graf 2



graf 5



graf 3



graf 6

